Vaccine → IRF7 ↓, STAT2 ↓ → STAT1 ↓ IRF9 ↓ → BRCA2 ↓ → breast cancer ovarian prostate leukaemia ↑

breast, uterine, ovary, pancreas, cancer を抑制 ← BRCA1↑ + IFNα, IRF-9 → BRCA2（DNAの修復を担う）の機能を保つ（必須）

IFNα 産生↑

IFNs → covid-19 重症化を防ぐ

IFNβ の産生↑ ← interferon（IFN） 1957年発表

IRF7, STAT1, STAT2↑

IRF7, IRF9 → 低下 → covid-19 重症化

キラーT細胞, ~~killer T cell~~ の活性化

BRCA1↓ → アポトーシス↑

リンパ球 マクロファージ で産生 ← influenza A virus の感染 → IFN I, II, III

ウイルスRNAで TLR3, 7, 8 が活性化

MHC class I の抗原提示機能↑

IFN I { α 13種 / β 1種 } → 1つ手遅れ → ウイルス, がん細胞の抑制（自殺分裂を止める）

アポトーシスの促進 または p53の促進にまで

ウイルス感染 がん細胞の発現

viral infection ↓
solid tumor ↓
hematopoietic neoplasma ↓
autoimmune disease (multiple sclerosis) ↓

Vaccine → lymphoma ↑

ヤヌスキナーゼの活性化 → STAT1, STAT2 のリン酸化↑ → 発がん 免疫抑制

IFN regulatory factors : IRF

IRF6 ← IRF9 → 免疫分化性白血病を抑える IL-6 を介して ~~IFNα~~ IFNαの効果を高める 前立腺がんを抑制

: antiviral, anti-tumor

STATs + IRF9 ↓ (ISGF3 と呼ぶ)

plasmacytoid dendritic cells（形質細胞様樹状細胞）→ 抗体産生

ウイルス発芽の抑制

p53 をアセチル化し活性化 IFNβ を産生

IL-6 形質細胞が作用すると ↑ となる

tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) receptor 1 and 2 に結合 活性化, 造血幹

リンパ節内で B cell → プラズマブラスト に形質転換

IFNαはIRF9を抑制し, TRAIL-R への結合が阻害されると

IL-10 を産生

自己免疫疾患の発症を抑制する

pseudouridine を塗布によって TLR の反応を止めることができる → IFN が反応しない

IFNγ

・セリン/トレオニン活性化
・半減期短い
・ISGF3 で増加する

TRAIL, IL-15, ISG-56 CORO を増加させる

血液がん↑ 大腸ガン↑ 肝臓がん↑ リンパ腫↑

TRAIL と結合

IRF7-regulated gene が多いと乳がんの転移が少ない。前立腺がも同じ。

Death Receptor 4 (DR4) のリガンドとなる

caspanase などのカスケード開始 → apoptosis

IFNをいじりたい